

Пациент: DOE, JOHN
Номер заказа: JD4USARAD
Направивший врач: DR. DAVID LIVESEY

Дата исследования: 06.06.2010
Дата рождения: 01.01.1961

КТ брюшной полости и малого таза с контрастным веществом

Жалобы: боль в животе

Метод исследования: КТ брюшной полости, забрюшинного пространства и таза, аксиальные срезы после перорального введения контрастного вещества.

ОПИСАНИЕ:

Определяется диффузное понижение плотности печени, характерное для стеатоза печени.

Отсутствует расширение вне - и внутripеченочных желчных протоков.

Состояние после холецистэктомии.

Внутри - и внепеченочные желчные протоки не расширены

Селезенка без особенностей.

Поджелудочная железа имеет нормальные контуры и характеристики контрастирования.

Образования надпочечников не определяются.

Присутствует умеренных размеров жировая супраумбиликальная грыжа.

Размеры, контуры и конфигурация почек нормальны. Отсутствуют признаки почечных и лоханочно - мочеточниковых образований.

Почечные и мочевые камни не определяются. Отсутствует гидроуретер и гидронефроз.

Отсутствуют признаки аппендицита.

Выявляется некоторое количество жидкости в тонкой кишке, которое может быть обусловлено умеренным энтеритом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ:

1. Некоторое количество жидкости в тонкой кишке может быть обусловлено умеренным энтеритом.
2. Стеатоз печени.
3. Состояние после холецистэктомии.
4. Жиросодержащая пупочная грыжа.

ТАЗ:

Отсутствуют признаки дивертикулита или острого воспалительного процесса в полости таза.